



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations


eofmd
european commission for the
control of foot-and-mouth disease



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ, ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ



Σε περίπτωση υποψίας περιστατικού
Αφθώδους Πυρετού, πρέπει να
ενημερώνονται ΑΜΕΣΑ οι τοπικές
κτηνιατρικές υπηρεσίες.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Αποβολές και αιφνίδιοι θάνατοι
των νεογνών.

Ανορεξία.

Κατάπτωση.

Πυρετός.


Χωλότητα.

Μείωση της γαλακτοπαραγωγής.

Σιαλόρροια.

Φυσαλίδες και αλλοιώσεις.

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ



Τα
αιγοπρόβατα
πιθανόν να
παρουσιάσουν
συχνά πολύ
ήπια κλινικά
συμπτώματα
με αποτέλεσμα
το νόσημα να
διαφύγει της
προσοχής.

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ

Αλλοιώσεις στα μεσοδακτύλια
διαστήματα, συχνά συνοδευόμενη από
χωλότητα.



Αυξημένη σιελόρροια. Διαβρώσεις
και έλκη στη στοματική κοιλότητα.





Funded by the
European Union

ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ




ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ




Η σημαντικότερη οδός μετάδοσης είναι η άμεση επαφή με ζώο που νοσεί.



Δεύτερη σημαντικότερη πηγή μετάδοσης είναι η κατανάλωση μολυσμένων ζωικών προϊόντων.
π.χ. σίτιση των ζώων με ανθρώπινα διατροφικά υπολείμματα ή μη επεξεργασμένο γάλα.



Επιπλέον οδός μετάδοσης μπορεί να είναι η μηχανική μέσω σωματιδίων του ιού που μεταφέρονται με άψυχα αντικείμενα όπως υποδήματα, ρουχισμό, κτηνιατρικά εργαλεία ή οχήματα.



Η αερογενής μετάδοση δεν είναι η συνήθης, ωστόσο είναι δυνατή, ιδίως όταν αφορά σε μεγάλες χοιροτροφικές μονάδες που γειτνιάζουν και υπό ορισμένες καιρικές συνθήκες. οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία ευνοούν την μετάδοση του ιού.