

ΤΑΚΛΑ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
68de172e9f068df76bd816e8
ΑΠ:266764
Υπογραφή: 02/10/25 09:34
Διανομή: 02/10/25 10:14

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Βερανζέρου 46
Ταχ. Κωδ.: 10438, Αθήνα
Πληροφορίες Α. Λάγιου, Θ. Δέλλιος, Δ. Μαυραγάνης.
: 2105271604, 1619, 5724
Τηλέφωνο: alagiu@minagric.gr
e-mail: thdellios@minagric.gr
dmavraganis@minagric.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Πρωτ.: 39954
Ελπίδα: 16.10.25

Προς: Υπ. Περιβάλλοντος &
Ενέργειας
Δ/ση Προστασίας Δασών
Δ/ση διαχείρισης Δασών

Κοιν.: Υπουργός Α.Α.Τ.
Υφυπουργό Α.Α.Τ.
Γενικό Γραμματέα Α.Α.Τ.
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής

ΘΕΜΑ: «Έκτακτα μέτρα κατά την άσκηση θήρας για την αποτροπή της εξάπλωσης της επιζωοτίας της Ευλογιάς των προβάτων και των αιγών».

ΣΧΕΤ. Το Α.Π ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/100508/3734/29-09-2025 έγγραφο του Τμ. Διαχείρισης άγριας ζωής και θήρας της Δ/σης διαχείρισης δασών.


Η ευλογιά των προβάτων και των αιγών αποτελεί ιδιαίτερα μεταδοτική ιογενή νόσο των αιγοπροβάτων. Η κατανόηση των οδών μετάδοσης του ιού είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική πρόληψη και τον έλεγχο της νόσου. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω της άμεσης επαφής μολυσμένων με υγιή ζώα. Τα μολυσμένα ζώα αποβάλλουν τον ιό μέσω του σιέλου, των ρινικών και οφθαλμικών εκκρίσεων, καθώς και μέσω των δερματικών αλλοιώσεων (εφελκίδων), αμέσως μετά την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων. Ο ιός μπορεί να παραμείνει μολυσματικός στις εφελκίδες για περισσότερο από 6 μήνες. Μεταδίδεται, επίσης, μηχανικά από μολυσμένο εξοπλισμό, αγροτικά αυτοκίνητα αλλά και μέσω εντόμων, ενώ δεν αποκλείεται η μηχανική μεταφορά και μέσω σκύλων (π.χ. τσοπανόσκυλων ή κυνηγετικών). Ο άνθρωπος δεν μολύνεται από τον ιό αλλά ούτε από τα τρόφιμα αιγοπρόβειας προέλευσης.

Η επιζωοτία της ευλογιάς έχει λάβει δραματικές διαστάσεις στη χώρα μας, με σοβαρές επιπτώσεις στην αιγοπροβατοτροφία και στην οικονομία γενικότερα. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους είναι εξαιρετικά δύσκολη η αντιμετώπιση της επιζωοτίας

της ευλογιάς είναι η ανθεκτικότητα του ιού, ο οποίος επιβιώνει για περισσότερους από 6 μήνες στο περιβάλλον.

Η μηχανική μεταφορά του ιού, μέσω των υποδημάτων, του εξοπλισμού, του ρουχισμού και των οχημάτων μπορεί να συντείνει στη διασπορά της νόσου και να μολύνει εκτροφές αιγοπροβάτων. Τα οχήματα αποτελούν σημαντικό παράγοντα διασποράς του ιού προς υγιείς εκτροφές, ειδικότερα όταν δεν έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί καταλλήλως.

Στο χάρτη απεικονίζονται, οι Περιφέρειες που πλήττονται κατά το μέγιστο και είναι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με μεγάλο αριθμό θετικών εκτροφών σε Λάρισα, Μαγνησία, Καρδίτσα και Τρίκαλα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με εστίες σε Ημαθία, Πιερία και Σέρρες, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με μεγάλο αριθμό θετικών εκτροφών σε Ξάνθη, Ροδόπη, Σαμοθράκη και Βόρειο Έβρο. Επίσης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την Αχαΐα και τέλος μεμονωμένες εστίες σε Φλώρινα και Κοζάνη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.



Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παραπάνω λόγους, κρίνεται απαραίτητη η συμβολή των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η εμπλοκή των εποπτευόμενων από το ΥΠΕΝ φορέων, όπως οι Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ, αλλά και οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, για την ενημέρωση των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο χώρα για το πρόβλημα αυτό αλλά και για τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας (πρόληψη) για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς της νόσου.

Στο πλαίσιο αυτό, συστήνεται η λήψη προληπτικών μέτρων βιοασφάλειας από τους χρήστες της γης (κυνηγούς, αγρότες, επισκέπτες κλπ) κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους σε περιοχές που έχουν εκδηλωθεί εστίες της νόσου. Επισημαίνεται η σημασία των ανωτέρω μέτρων, ιδίως κατά την άσκηση της θηρευτικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα κατά την άσκηση θήρας που διενεργείται σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την ετήσια ρυθμιστική απόφαση για τη θήρα, είναι απαραίτητο οι κυνηγοί να ενημερώνονται από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις αλλά και τις Δασικές Υπηρεσίες με κάθε τρόπο, ώστε να λαμβάνουν προληπτικά κατά τη θηρευτική δραστηριότητα, ατομικά μέτρα που θα συμβάλλουν στον περιορισμό της διασποράς της νόσου, ως ακολούθως:

- Να αποφεύγεται η προσέγγιση των κυνηγών πλησίον κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δεδομένης της ισχύουσας οριζόντιας απαγόρευσης της θήρας κοντά σε σταβλικές εγκαταστάσεις και μεμονωμένες κτηριακές υποδομές.
- Να αποφεύγεται αυστηρά η προσέγγιση κυνηγών ή των κυνηγετικών κυνών σε εγκαταλελειμμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να έχουν εκκενωθεί λόγω επιζωotίας.
- Να λαμβάνονται, με συστηματικό τρόπο και σε όλες τις εξόδους των κυνηγών, μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης. Για τον σκοπό αυτό οι κυνηγοί θα πρέπει να διαθέτουν σε κάθε μετακίνησή τους, συσκευή εκνέφωσης (ψεκαστικό δοχείο) με κατάλληλο απολυμαντικό. Κατά την παρασκευή των διαλυμάτων χρησιμοποιούνται γάντια μιας χρήσης, προστατευτικές μάσκες/γυαλιά.
- Να προβαίνουν σε καθαρισμό και απολύμανση, των οχημάτων τους ιδίως των τροχών των μεταφορικών μέσων μετά από κάθε διέλευση από περιοχές που υπάγονται σε ζώνες προστασίας και επιτήρησης και Περαιτέρω Απαγορευμένες Ζώνες, καθώς και απολύμανση των υποδημάτων τους πριν την είσοδο στα οχήματα μεταφοράς, με τη χρήση ταπέτου εμποτισμένου με το κατάλληλο απολυμαντικό. Στην περίπτωση που υπάρχουν στην περιοχή που μετακινούνται απολυμαντικές τάφροι, αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.
- Τα υποδήματα και ο ιματισμός τους να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε έξοδο.
- Οι κυνηγοί που δραστηριοποιούνται παράλληλα ως κτηνοτρόφοι, να χρησιμοποιούν διαφορετικό ιματισμό και υποδήματα από εκείνα που φέρουν κατά την είσοδό τους στις εκτροφές τους.
- Να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα κυνηγετικά σκυλιά να μην προσεγγίζουν

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ακόμη κι αν είναι εγκαταλελειμμένες και στην περίπτωση που κινηθούν σε ύποπτες περιοχές να ακολουθεί υποχρεωτικά το πλύσιμο των πελμάτων.


- Να ενημερώνουν άμεσα τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες, σε περίπτωση υποψίας παρουσίας της νόσου σε αιγοπρόβατα.

Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι καθοριστική για την επιτυχία των μέτρων περιορισμού και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της Ευλογιάς, που πλήττει σοβαρά τον πρωτογενή τομέα και την κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων

AFRODITI MIKELI
14/10/2025 09:35

Μ. Γιαννιού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ -Τ.Κ.: 621 25
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μπεχτσή
ΤΗΛ: 2321356441
e-mail: bextsi@serres.pkm.gov.gr

Σέρρες, 15 Οκτωβρίου 2025

Αριθ. Πρωτ:767401(32654)

Προς:1) Δασαρχεία Π.Ε Σερρών
2) Δήμους Π.Ε Σερρών
3) Α.Τ. Π.Ε Σερρών
4) Κυνηγετικούς Συλλόγους

ΘΕΜΑ: «Έκτακτα μέτρα κατά την άσκηση θήρας για την αποτροπή της εξάπλωσης της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων»

Σας διαβιβάζουμε τα υπ.αριθ.πρωτ.:266764/02-10-2024 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά τα έκτακτα μέτρα κατά την άσκηση της θήρας για την αποτροπή της μετάδοσης της επιζωοτίας της Ευλογιάς των προβάτων και των αιγών.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Οκτ 16 2025
Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής
Π.Ε Σερρών
Αναστασία Βαλτοπούλου